

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „KVS SVS pro MS kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 47 odst. 4 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), podle § 54 odst. 1 a odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a v souladu s ustanovením § 15 a § 76 odst. 3, písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – varroázy včel

Článek 1 Poučení o nákaze

Varroáza je nebezpečná nákaza způsobená roztočem *Varroa destructor*. Roztoč napadá včelí plod – nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnožuje, a rovněž dospělé včely.

Roztoč může být přenašečem virových, bakteriálních a plísňových onemocnění včel a včelího plodu.

Nákaza se šíří především nakaženými trubci, včelami, roji a loupežením zdravých včel v nemocných včelstvech.

Tento roztoč, pokud není včelstvo léčeno účinnými přípravky, způsobuje úhyn včelstva.

Článek 2 Diagnostika

Diagnóza se stanoví na základě:

- (1) klinického vyšetření zejména zavíčkovaného trubčího plodu,
- (2) laboratorního vyšetření spadu, měli a včel.

Článek 3 Prevence nákazy

- (1) pravidelné diagnostické ošetření a následné vyšetření,
- (2) léčebné ošetřování včelstev,
- (3) provádění chovatelských opatření (odstranění zavíčkovaného trubčího plodu, omezování plodování v podzimu, nepřítomnost plodu ve včelstvu v době léčebného ošetření včelstev – klíckování matek apod.),
- (4) utrácení rojů neznámého původu a divoce žijících včelstev.

Článek 4 Opatření při vzniku nákazy

- (1) **Vymezení pojmů**
 - a) ohnisko nákazy – stanoviště včelstev, na němž byla zjištěna varroáza, a to při nálezů více jak 3 roztočů *Varroa destructor* v průměru na 1 včelstvo,
 - b) ochranné pásmo – pásmo vymezené kolem ohniska nákazy v okruhu 5 km,

- c) směsný vzorek – veškerá zimní měl nebo spad, odebraný po léčbě ze všech úlů jednoho stanoviště včelstev,
- d) za ošetření (léčebné, diagnostické) se považuje ošetření provedené v souladu s mimořádnými veterinárními opatřeními KVS pro MS kraj komisionálně za přítomnosti chovatele.

(2) Vymezení ohniska, ochranné pásmo

Všechna včelstva v Moravskoslezském kraji jsou v ochranném pásmu varroázy včel.

(3) Stanovení způsobu diagnostického, léčebného a preventivního ošetřování včelstev.

Chovatelům včel v ochranném pásmu varroázy včel se nařizuje:

a) Letní období

V průběhu července a srpna 2012 po vytočení medu chovatelé umístí do svých včelstev léčebné pásky s přípravkem GABON PA 1,5 mg nebo GABON PF 90 mg, které budou ve včelstvu zavěšeny po dobu 24 dnů. Tento způsob ošetření se provede v případech:

1. kdy při vyšetření zimní měli (na jaře 2011) mělo více než 25% stanovišť průměrný nález více než 3 samičky *Varroa destructor* na včelstvo,
2. kdy byla diagnostikována vysoká invadovanost (stupeň napadení) trubčího plodu,
3. kdy byl průměrný přirozený letní spad roztočů vyšší než 5 samiček denně, či je signalizována vysoká intenzita varroázy prohlídkou včelstev.
4. KVS SVS pro MS kraj povolí tento způsob ošetření včelstev na základě žádosti příslušné Základní organizace Českého svazu včelařů (dále jen „ZO ČSV“).

Během pozdního jara a po celé léto pokud teploty v průběhu celého dne dosahují alespoň 20 °C lze aplikovat FORMIDOL 40 ml – odparné desky s kyselinou mravenčí. Při nesprávné aplikaci se mohou projevit negativní vedlejší účinky na včelstva.

b) Podzim a zima

V období od 10.10.2012 do 31.12.2012 jsou chovatelé včel povinni provést ve všech včelstvech třikrát ošetření včelstev přípravkem VARIDOL 125 mg/ml. Ošetření se provede komisionálně formou fumigace nebo aerosolu. Při 2. a 3. ošetření nesmí být ve včelstvech přítomen zavíčkovaný plod. Pokud je v době 2. a 3. ošetření - např. při teplém počasí – zavíčkovaný plod, odstraní se vyřezáním nebo rozdrásáním tak, aby přítomní roztoči byli zpřístupněni účinným látkám při fumigaci nebo aerosolovém ošetření. Doporučené intervaly mezi ošetřeními jsou 14 – 21 dní. Tři ošetření se provádějí bez ohledu na to, zda byl v podletí použit GABON PF 90 mg nebo GABON PA 1,5 mg. Poslední ošetření lze provést aerosolem i začátkem prosince, kdy jsou včelstva bez plodu. Při použití acetonu lze aerosol aplikovat do teploty minus 5°C. Toto ošetření je významné k zabránění tvorby resistance.

ZO ČSV nahlásí na KVS SVS pro MS kraj chovatele a počty včelstev, jejichž stanoviště jsou v obvodu ZO ČSV a která ZO ČSV neošetřovala, a to nejpozději do 15.01.2013.

U všech včelstev musí být nejpozději do 30. září každého roku vloženy na dna úlů podložky. Tyto se vždy po skončení diagnostického odběru spadu nebo po ukončení léčby řádně ometou, očistí a vrátí zpět na dno úlu. Po posledním ošetření před odběrem zimní měli se doporučuje interval mezi ošetřením a ometením podložek v délce 7 dní. Vzorky měli se odeberou a odevzdají k vyšetření do 15. února 2013. Poslední ošetření a odběr se musí časově sladit tak, aby mezi ometením podložky po posledním ošetření a odběrem měli byla přestávka nejméně 30 dní. Zimní měl nesmí být po odběru přesívána přes síta s otvory menšími než 4 mm, aby mohl být při vyšetření zachycen i eventuální výskyt malého úlového brouka *Aethina tumida*. Vyšetření provádějí Státní veterinární ústavy a Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol (dále jen VÚVč, s.r.o.“).

V místech zvýšené intenzity varroázy, kdy po třetím (event. již druhém) ošetření je patrný vysoký spad roztočů může KVS SVS pro MS kraj výjimečně povolit další ošetření, kterým se obvykle nahradí ošetření jarní.

c) Jarní období

Předjarní ošetření včelstev jsou chovatelé včel povinni provést v jednotlivých ohniscích, a to:

1. V oblastech, kde nebyla prokázána resistance roztočů na pyrethroidy:
 - v okresech s výskytem hromadných úhynů včelstev se předjarní ošetření provede celoplošně
 - v ostatních okresech se vyhodnotí extenzita varroázy podle procenta stanovišť bez nálezu roztočů v zimní měli. V okresech, ve kterých procento stanovišť bez nálezu nedosáhlo 25% všech vyšetřovaných vzorků se předjarní ošetření provede rovněž plošně u všech včelstev. V okresech, v nichž byl vyšší podíl vzorků bez nálezu než 25% se ošetří pouze včelstva stanovišť s nálezem více než tři samičky *Varroa destructor* v průměru na včelstvo. KVS SVS pro MS kraj však povolí i ošetření stanovišť s podlimitním nálezem, pokud sami chovatelé včel o toto ošetření písemně požádají.

Předjarním ošetřením se rozumí nátěr víček zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER 240 mg/ml, spojený s fumigací přípravkem VARIDOL 125 mg/ml. Rozhodující význam má nátěr plodu, kterým jsou postiženi roztoči a jejich vývojová stadia uvnitř plodových buněk i roztoči na včelách. Fumigace VARIDOLEM 125 mg/ml je pojistkou při eventuální resistenci roztočů na pyrethroidy a pro případ, že plocha plodu je nedostatečná. Emulze (0,25%) se připraví vmícháním 5 kapek M-1 AER 240 mg/ml do 50 ml vody. Natírá se opatrně pomalými pohyby, aby emulze pronikla víčky, ale nebyly zasaženy ostatní plochy plástu. Nenatírá se více než 10 dm² zavíčkovaného plodu. Emulzi připravujeme vždy čerstvou.

2. V oblastech s prokázanou resistencí roztočů na pyrethroidy se nepoužívá nátěr plodu. Provedou se dvě ošetření VARIDOLEM 125 mg/ml v intervalu 10 dní a doporučí se ošetření FORMIDOLEM 40 ml, a to co nejdříve, jakmile dosáhnou denní teploty bez větších výkyvů 20 °C. Jarní ošetření (kromě ošetření FORMIDOLEM 40 ml v rezistentních oblastech) musí být skončeno nejpozději do 15. dubna 2012. Pro jarní ošetření není možno používat přípravky GABON PF 90 mg a GABON PA 1,5 mg.

(4) Zásady zvýšení účinnosti systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů *Varroa destructor*.

Okresní výbory ČSV na svém území organizují monitoring tak, aby v každé ZO ČSV bylo několik zodpovědných včelařů, kteří v období od 1. června do 30. června ve čtrnáctidenních intervalech a od 1. července do 30. září v týdenních intervalech u svých vybraných včelstev (nejlépe okrajových a nejsilnějších) budou provádět monitorovací pozorování a výsledky předávat KVS SVS pro MS kraj. Monitoring v tomto období se skládá z odečtu denního přirozeného spadu roztočů z upravené podložky nebo dna proti vynášení roztočů včelami a prohlídky trubčího plodu.

Alespoň na třech místech plodiště se odvíčkují dvacet trubčích buněk ve stadiu fialových očí, kukly se vyjmou a zhodnotí se dohromady množství dospělých samic, vývojových stadií sameček a vajíček. Za ohrožující stav, vyžadující okamžitý zásah, se považuje denní spad 5 a více samic roztoče a silné napadení trubčích kukel u více než poloviny prohlédnutých buněk u některého včelstva.

Od 10. října do 31. prosince hlásí včelař monitorovacího stanoviště spad roztočů zjištěný následující den po ošetření. Hlavní důraz se klade na výsledky u prvního podzimního ošetření. Stejně tak hlásí neobvyklý spad roztočů po všech ošetřeních v průběhu sezóny.

Na základě výsledků monitoringu může KVS SVS pro MS kraj nařídit i jiný způsob ošetření kromě způsobů popsaných v článku 4 odst. (3).

Kromě léčebných ošetření včelstev ve stanovených obdobích nařízených KVS SVS pro MS kraj není povoleno chemické ošetření včelstev s výjimkou odparných desek FORMIDOL 40 ml.

Přesunované oddělky budou ošetřeny obdobně jako kočující včelstva (viz článek 5)

- (5) **ZO ČSV předají na příslušné inspektoráty KVS SVS pro MS kraj doklad o provedení všech výše uvedených a nařízených ošetření, se seznamem chovatelů a stanovišť včelstev.**

Článek 5 Přesuny včelstev

Přesunovat je možno pouze včelstva, u kterých byla provedena opatření nařízena v článku 4 tohoto nařízení v období mimo nařízených vyšetření a ošetření.

Mimo územní obvod Moravskoslezského kraje lze přesun uskutečnit za předpokladu, že přemísťovaná včelstva budou doprovázena veterinárním osvědčením vystaveným úředním veterinárním lékařem. Přemísťovaná včelstva musí být před přesunem mimo kraj bakteriologicky vyšetřena na přítomnost moru včelího plodu, tuto skutečnost doloží chovatel příslušným dokladem – laboratorním protokolem s negativním výsledkem vyšetření směsného vzorku měli.

Přesun včelstev kočováním je povolen:

- (1) obecně do oblastí o stejné nálezové situaci,
- (2) byla-li včelstva vyšetřena a léčebně ošetřena, přičemž ve směsném vzorku měli nebyli zjištěni více než 3 roztoči na jedno včelstvo. V jednotlivých případech může být přesun povolen i když počet roztočů přesahuje tuto hranici a chovatel prokáže, že všechna včelstva stanoviště byla ošetřena v předjaří podle článku 4 odst. (3), písm. c) tohoto nařízení,
- (3) kočující včelstva musí být neprodleně po každém návratu po 1. červnu z kočovného stanoviště (na trvalém stanovišti nebo na dalším kočovném stanovišti) preventivně přeléčena a to FORMIDOLEM 40 ml (pokud se návrat uskuteční před posledním vytočením medu) a GABONEM PA 1,5 mg nebo přípravkem na bázi tymolu (pokud se návrat uskuteční po posledním vytočení medu). V rezistentních oblastech se provede ošetření FORMIDOLEM 40 ml, v případě silného napadení opakovaně.

Přesuny matek a doprovodných včel ze všech stupňů chovů jsou povoleny po provedení všech nařízených diagnostických a léčebných opatření stanovených tímto nařízením. Přesuny vajíček a otevřených matečnicků jsou povoleny bez omezení. Předpisy, omezující přesuny včelstev v důsledku výskytu bakteriálních nálezů (mor a hniloba včelího plodu), nejsou opatřeními na varroázu nikterak dotčeny.

Článek 6 Prevence vzniku a šíření rezistentních roztočů k pyretroidům

Cílem stanoveným pro rok 2012 je pokračovat v monitorovacích akcích, vytyčit rezistentní oblasti (ohniska a jejich ochranná pásma) a pokusit se určit původ rezistentních roztočů. V potvrzených rezistentních oblastech je cílem dosáhnout co nejvýraznější přerušování generačního cyklu až likvidace populace rezistentních roztočů během soustavy podzimního a zimního léčení.

- (1) Monitoring se provádí:
 - a) křížovými pokusy (Gabon PA 1,5 mg x Gabon PF 90 mg) dle metodiky VÚVč, s.r.o.
 - b) křížovými pokusy (Varidol 125 mg/ml x MP 10 FUM 24 mg/ml) dle metodiky VÚVč, s.r.o.

Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení

- (1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3, písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. Doba platnosti tohoto nařízení se stanovuje do odvolání.
- (2) Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj č. 3/2011 ze dne 31.05.2011, č.j. 2011/1737/KVST.o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – varroázy včel

V Ostravě 27.06.2012



Platný podpis
Digitálně
podepsáno
Jméno: MVDr.
Severin Kaděrka
Datum: 28.06.2012
06:39:17

MVDr. Severin Kaděrka
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro
Moravskoslezský kraj

Vyvěšeno na úřední desce
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
dne 28.06.2012

EV. č. 56/12
Vyvěšeno na úřední desce
Městského (obecního) úřadu
v PĚTRVALDĚ dne *1. 8. 2012*

Sejmuto dne.....

DO ODVOLÁNÍ
Sejmuto dne.....

OBEČNÍ ÚŘAD
742 60 PĚTRVALD
okresový úřad

MILUŠE MALÍKOVÁ